

ПАМЯТКА

пациента, получившего зубные протезы с
опорами на дентальные имплантаты



Благодарим Вас за выбор ГАУЗ «СП № 64 ДЗМ» для оказания
квалифицированной стоматологической ортопедической помощи.

Мы гарантируем, что при стоматологическом ортопедическом лечении
применялись безопасные, сертифицированные, качественные
конструкционные стоматологические материалы.

1. Несъемные зубные протезы на имплантатах (коронки, мостовидные протезы) так же, как естественные зубы, необходимо дважды в день после еды чистить с помощью зубной щетки (подойдут мягкие, мануальные или электрические щетки, монопучковые, межзубные щетки) и пасты. Кроме того, после каждого приема пищи полость рта следует полоскать водой для удаления остатков пищи.

2. Использовать зубные пасты с малым содержанием абразивных наполнителей, с содержанием NaF на уровне 0,2% и ниже, близкие к нейтральному водородному показателю (с pH на уровне 7,0, но не менее pH 6,2).

3. Один раз в день проводить чистку с помощью зубной нити, ленты или специальной нити с держателем. С помощью зубной нити следует очищать всю окружность имплантата, а не только контактные пункты. Следует производить визуальный контроль зубной нити после использования: если нить истерта или разволокнена, возможно наличие зубного камня и/или избытка цемента. В таком случае следует обратиться к лечащему врачу.

Дважды в день полоскать рот ополаскивателями, в составе которых отсутствует спирт. После полоскания следует воздержаться от приема пищи и питья в течение 30 минут.

4. Один/два раза в день используйте ирригатор, устанавливая его на низкую мощность. Направляйте поток воды горизонтально, отступив на 0,5 см от гладкой поверхности зуба/коронки. Не направляйте поток воды в десневую борозду или зубодесневой карман.

5. По выбору методов и средств гигиены следует проконсультироваться с лечащим врачом.

6. Если протез зафиксирован на временный цемент, не рекомендуется жевать жевательную резинку и другие вязкие пищевые продукты.

7. Во избежание поломки протеза, скола облицовочного материала, а также повреждения слизистой оболочки полости рта не рекомендуется грызть и пережевывать очень жесткую пищу (например, сухари, орехи, конфеты типа ирисок и леденцов и т.д.), откусывать от больших кусков (например, от целого яблока), так как это может привести к повреждению или поломке коронки, мостовидного протеза на имплантатах.

8. В случае скола облицовочного материала или поломки протеза, а также при нарушении фиксации несъемного протеза («хлюпанье», подвижность протеза, неприятный запах изо рта), при появлении болевых ощущений в области имплантатов, воспаления десен вокруг имплантатов (кровоточивость десны) необходимо обратиться к лечащему врачу.

9. Съемные протезы на имплантатах необходимо чистить отдельной зубной щеткой с пастой до полного очищения протеза от мягкого налета. Вместо пасты можно применять специальные растворы после каждого приема пищи.

10. На ночь необходимо помещать протез в очищающий раствор в специальный контейнер или оставлять съемный протез в полости рта во время сна, если это не вызывает явного дискомфорта.

11. Необходимо избегать сочетания резких перепадов температуры пищи (таких как горячий кофе или мороженое).

12. В первый год для оценки состояния имплантатов и протезов, а также для проведения профессиональной гигиены полости рта необходимо посещать врача-стоматолога согласно назначению. В дальнейшем - через каждые 6 месяцев.

13. Следует ставить в известность лечащего врача в случае проблем, возникших в результате пользования ортопедическими конструкциями, утраты зубов и проведения стоматологического лечения в других лечебных учреждениях.

По вопросам качества ортопедического лечения Вы можете обращаться к заведующему отделением ортопедической стоматологии.

Мы заинтересованы в качественном оказании медицинской помощи и ценим мнение пациентов о нашей работе.

Все замечания и предложения Вы можете направить на электронную почту sp64@zdrav.mos.ru

или сайт <https://sp64dzm.ru>